

Mekostest 36

Nr. 31 - Hydrokortison-17-butytrat

Mekostest® visar att du är allergisk mot hydrokortison-17-butytrat.

Det betyder att det kan bli eksem i hudområden som kommer i kontakt med hydrokortison-17-butytrat.

Var finns hydrokortison-17-butytrat?

Hydrokortison-17-butytrat och liknande kortikosteroider är antiinflammatoriska föreningar som används brett. Bland annat finns ämnet i läkemedel mot eksem och andra lokala inflammationer i huden. Det finns i krämer, lotioner, salvor och puder. Men, det kan även förekomma i öron-, näs- och ögondroppar för användning mot hörsnuva/allergisk snuva, mellanöre- och öroninflammation.

Hur undviker du hydrokortison-17-butytrat?

Undvik mediciner som innehåller hydrokortison-17-butytrat och korsreagerande kortikosteroider. Om du har en kraftig allergi mot hydrokortison-17-butytrat kommer även små mängder hydrokortison-17-butytrat att ge en allergisk reaktion, normalt inom 24 timmar, och den kan pågå i mer än en vecka. Om din allergi mot hydrokortison-17-butytrat endast är lindrig kan den antiinflammatoriska effekten av hydrokortison-17-butytrat att dölja eksemet i ett första skede. Kom ihåg att informera din läkare om att du är allergisk mot hydrokortison-17-butytrat.

Besläktade ämnen som du ska undvika:

- Hydrokortisonaceponat
- Hydrokortisonbuteprat
- Metylprednisolonaceponat
- Prednikarbat

Du kan också reagera mot följande ämnen:

- Cloprednol
- Budesonid
- Fludrokortisonacetat
- Hydrokortison
- Hydrokortisonacetat
- Metylprednisolon
- Prednisolon
- Tixocortolpivalat

Denna lista är inte komplett.

När du köper produkter som kan komma i kontakt med huden, undersök alltid innehållsförteckningen för att se om den innehåller något från listan ovan. I sådana fall kan du kontakta apoteket eller din läkare för ett alternativ.

Denna information ersätter inte den information som ges av läkaren utan ska ses som ett komplement till denna.